

بسمه تعالی

Case Presentation: Febrile toddler With refusal to walk

یک پسر ۲۲ ماهه به دپارتمان اورژانس آورده شد که به مدت ۳ روز تب بالای ۳۹.۵ درجه سانتیگراد داشته، یک روز درد واضح زانوی راست و عدم توانایی راه رفتن. هیچ سابقه ای از تماس با فرد بیمار- تروما- سرفه- Congestion- تهوع یا اسهال وجود نداشته. در معاینه بالینی $T=38.5^{\circ}C$ ، $PR=102$ beats in minute.

$Bp= 95/40$ mmHg و $RR= 25$ beats in minute.

معاینه اندام هیچ تورم واضح مفصلی ندارد گرچه یک محدودیت حرکتی مفصلی در زانو و هیپ راست در حرکات پسوی و اکتیو بهمراه Guarding مشاهده می شود. رادیوگرافی اندام تحتانی نرمال است. مطالعات آزمایشگاهی

$WBC = 17800$ ، $ESR = 52$ ، $CRP = 71$ mg/lit . آسپیراسیون مفصل زانو dry بود و سفتریاکسون ←

وریدی بعد از گرفتن کشت های خون شروع شد. انجام MRI پای راست به علت ناکافی بودن Sedation ممکن نشد و اسکن ۳ فازه استخوان به جای آن انجام شد. تیترا لایم و کشت خون بعد از ۴۸ ساعت منفی بود. مجدداً معاینه بالینی انجام شد که در extension هیپ درد شدید و Flexion هیپ مقاومت ایجاد می شود.

تکرار $CRP = 180q$ و CT شکمی گرفته شد (Figure 1)